



Vincent Lecomte
Bazège (31)
Tél : 05 62 71 79 36
lecomte@cetiom.fr



Franck Duroueix
Agen (47)
Tél : 05 53 98 36 79
duroueix@cetiom.fr




jeudi 29 octobre 2009

Vols de charançons du bourgeon terminal

■■■ Colza : pression charançon du bourgeon terminal et grosse altise :

Le réseau SBT¹ de Midi-Pyrénées montre un début d'activité des charançons du bourgeon terminal (CBT) sur colza depuis le début de la semaine de façon plus ou moins importante selon les secteurs.



Charançon du bourgeon terminal : corps noir et brillant avec une pilosité courte clairsemée ; taches latérales blanches entre le thorax et l'abdomen (pas toujours présentes), extrémité des pattes rousses- Taille adulte = 2,5 à 3,7 mm

L'extension de la zone concernée par les vols de CBT observée l'an passé se confirme cette année et se poursuit. Le CBT est présent aujourd'hui sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, du Lot-et-Garonne et de l'Ouest-audois.

Dans les autres secteurs, le ravageur n'est pas présent dans les cuvettes, mais dans tous les cas, il est important de continuer les relevés de cuvettes.

La pression altise s'est également intensifiée ces derniers jours. Même si le risque adulte devient de plus en plus faible compte tenu des stades des colzas (stades supérieurs à 3 feuilles), le risque larves d'altises est quant à lui réel.

¹ SBT : Surveillance Biologique du Territoire

➔ Conseil

■ Sur Midi-Pyrénées, le Lot-et-Garonne, et l'Ouest-audois

La lutte contre le charançon du bourgeon terminal (CBT) doit être raisonnée en fonction des interventions contre les grosses altises d'hiver éventuellement réalisées ces derniers jours.

- Sur les parcelles où un traitement insecticide a déjà eu lieu entre le 26 et le 29 octobre : aucun traitement contre le CBT n'est nécessaire.
- Sur les parcelles non traitées à ce jour ou ayant reçu un insecticide avant le 26 octobre : traitez dès à présent pour une lutte optimale et anticiper l'épisode pluvieux prévu début de semaine prochaine.

Le traitement insecticide à base de pyréthrinoïdes de synthèse efficace à la fois contre la grosse altise et le CBT offre à cette saison une bonne persistance. Attention, dans le cadre de traitement, utiliser la dose CBT du produit.

■ Dans les autres secteurs : vigilance !

En cas de piégeage du CBT dans les cuvettes jaunes, traitez dans les 5 à 6 jours qui suivent les premières captures.

■■■ Colza : désherbage de rattrapage :

De nombreuses situations sont encore soumises à une forte pression de repousses de céréales. Dans ce cas, intervenir sans tarder.

La dose d'antigraminées doit être adaptée au stade des repousses : consulter l'étiquette.

NB : Pour l'utilisation de Kerb Flo, Rapsol WG et Légurame PM, attendre encore 2 à 3 semaines.



■■■ Colza : mélange antigraminée / insecticide :

Dans la plupart des cas, ces mélanges sont autorisés. Vérifier néanmoins le statut de votre mélange via l'outil « mélange » accessible à partir du site Internet <http://www.cetiom.fr>

■■■ Point gel des colzas :

Des dégâts ponctuels de gel sur des colzas au stade 2-3 feuilles ont été observés dans différents secteurs du Sud-ouest, en particulier dans les fonds de vallées froides ou sur les versants exposés au nord. Ces gels ont eu lieu à la mi-octobre.

Dans le cas le plus fréquent, le cœur de la rosette est resté vert et le colza a depuis bien repris grâce à la douceur des températures et à la pluviométrie

Dans quelques situations –zones froides des parcelles– des pertes de pieds significatives ont pu être observées. Les secteurs les plus touchés se situent dans la moitié nord de la région : départements 46, 32, 82.

Ces pertes de pied, s'expliquent par la rapidité et l'amplitude des variations de température (-15°C à -20 °C en trois jours) sur des jeunes colzas en

croissance, turgescents, et n'ayant subi aucun durcissement préalable de la cuticule.

Ces jeunes pieds de colza pouvaient par ailleurs être fragilisés par des interventions phytosanitaires préalables.

Quelle que soit la situation, attention aux décisions de retournement des colzas trop hâtives !

■■■ Info WEB espace SUD

BSV : un lien direct

- Midi-Pyrénées n°3 29 octobre 09
 - Languedoc-Roussillon n°1 22 octobre 09
- ➔ rubrique actualité Sud : conseils infos et BSV (<http://www.cetiom.fr/index.php?id=12671>)

R.T.R. Sud – 2009

Programme et inscriptions en ligne

- Toulouse Auzeville : 8 décembre
- Avignon : 16 décembre

(<http://www.cetiom.fr/index.php?id=3746>)