

☛ Anti-graminées foliaires : doses en fonction des mauvaises herbes et de leur stade

	s.a	Adjuvant	Flore	Stade / Dose		
				3 feuilles	4 feuilles – début tallage	Tallage – Montaison
Eloge (1) Dow Agrosciences	haloxyfop-R		annuelles, repousses	0,4	0,5	0,5
			ray-grass	0,5	0,5	0,5
			Vivaces	1		
Stratos + Dash BASF	cycloxadime	Dash (2)	annuelles, repousses	1	1	1,2
			Vivaces (10 à 20 cm)	2		
Pilot / Etamine Philagro / Bayer CS	quizalofop Ethyl-D		annuelles, repousses	0,7	0,8	1
			Ray-grass, folle avoine	1	1,2	1,5
			Vivaces	3		
Targa D+ /Léopard120 Bayer CS / Makhteshim	quizalofop Ethyl-D	Huile 1 l	annuelles, repousses	0,3	0,4	0,5
			Bromes, Ray-grass	0,5	0,5	0,6
			Vivaces	1,25		
Agil / Ambition Makhteshim-Agan	propaquizafop	Huile 1 l	annuelles	0,4	0,5	0,6
			Bromes	0,6	0,7	0,8
			Ray-grass	0,7	0,8	
			Vivaces	1,5 à 2		
Fusilade Max Syngenta Agro	fluazifop-p-butyl		annuelles, repousses	0,75	1	1,25
			Bromes, Ray-grass	1	1,25	1,5
			Vivaces	3		
Vesuve (3) Philagro France	quizalofop Ethyl-D cléthodime	Huile 1 l	repousses, brome, vulpin	0,3	0,35	0,4
			ray-grass	0,35	0,4	0,5
			Vivaces	0,8		
Ogive / Centurion 240EC (1) Phyteurop / Arysta LifeScience	cléthodime	Huile 1 l	annuelles	0,3	0,3	0,4
			folle avoine, repousses	0,4	0,4	0,4
Foly R / Noroit (1) Arysta LifeScience	cléthodime	Huile 1 l	annuelles, repousses folle avoine	0,6	0,6	0,6

Sources : données firmes

annuelles = ray-grass, vulpin, bromes, sauf si dose spécifique

(1) = applicable uniquement à l'automne

(2) = dose de Dash variable et équivalente à la dose de Stratos Ultra (consulter étiquette)

(3) = délai avant récolte de 120 jours

☛ Anti-graminées racinaires

Produit	Dose	Stade d'utilisation
KERB FLO - intervention précoce. Jeune plante	1,25 l/ha	A partir du 10 novembre, jusqu'à reprise de végétation
KERB FLO	1,8 l/ha	
RAPSOL WG	0,95 kg/ha	
LEGURAME PM	3 kg/ha	4 feuilles à 3 semaines avant reprise de végétation

Sources : données firmes